

# Gato Andino

## Andean Cat

FOTO TRAMPA CAMARA  
NICOLÁS LAGOS, CRISTIÁN SEPÚLVEDA Y RODRIGO VILLALOBOS

## Leopardus jacobita



JIM SANDERSON



JIM SANDERSON

El gato andino (*Leopardus jacobita*) es un pequeño felino que solamente se encuentra en las regiones altas de los Andes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú; es considerado como la especie felina con el mayor grado de amenaza en América y una de las menos conocidas a nivel mundial. Actualmente, se encuentra entre los cinco felinos más amenazados en todo el mundo. El gato andino es un felino de tamaño mediano, su pelaje es predominantemente de color gris cenizo con manchas café rojizas/amarillentas que se disponen en forma vertical a ambos lados del cuerpo dando la apariencia de franjas continuas. Se caracteriza por tener una cola muy larga (66 a 75% del largo de cabeza y cuerpo), gruesa, cilíndrica, de aspecto felpudo y con 6 a 9 anillos anchos y de color café oscuro a negro. Sus patas también presentan bandas o manchas oscuras más delgadas pero que no llegan a formar anillos completos.

A pesar de la poca información que existe sobre la especie y sus requerimientos, se puede afirmar que el hábitat del gato andino es naturalmente fragmentado y de alta fragilidad, particularmente en las regiones desérticas alto andinas. La especificidad de las vizcachas a ambientes rocosos probablemente es también un factor que esté influyendo en la distribución del gato andino y la densidad de sus poblaciones. En los diferentes estudios que se vienen realizando sobre el gato andino y su hábitat, se observa que los bofedales, laderas rocosas, colonias de vizcachas y otros roedores, así como la presencia de aves acuáticas son componentes importantes para el hábitat del gato andino.

Los gatos silvestres juegan un importante papel ecológico en un ecosistema por encontrarse en la cima de la cadena alimenticia o cerca de ella. Al ser animales carnívoros, ayudan al control de las poblaciones de las presas que son parte de su alimento. Los gatos pequeños, suelen alimentarse de varias clases de ratones y aves pequeñas o de tamaño mediano.

En Chile, el gato andino ha sido registrado en las Regiones de Arica y Parinacota y de Antofagasta. Sus mayores amenazas en el país son la caza oportunística, la pérdida de su hábitat y la disminución de sus poblaciones presa.

El gato andino, junto con el gato de las pampas (*Leopardus colocolo*), eran considerados especies sagradas por algunas culturas Andinas, relacionadas con la abundancia y bienestar; sus pieles aun son usadas en ceremonias para el marcado del ganado caméldo o al inicio de la época de siembra o cosecha. Ambas especies son conocidas como "titi", "titimisi" o "titiphisi" en zonas de habla Aymara y como "osqhollo" en zonas de habla Quechua.

The Andean cat (*Leopardus jacobita*) is a small cat only found in the high regions of the Andes of Argentina, Bolivia, Chile and Peru; it is considered as the feline species with the major degree of threat in America and it is also one of the least known cats in the world. At the present, it is found among the five most threatened cats worldwide.

The Andean cat is a medium-sized felid; its fur is mainly ash grey with brown-yellowish blotches that are distributed as vertical lines at both sides of the body, giving the appearance of continuous stripes. The tail of the Andean cat is very characteristic, it is very long (66 - 75% of the head and body length), thick and cylindrical, with a fluffy aspect and with 6 to 9 wide rings of dark brown to black colour. Their legs also have dark and narrower blotches or stripes, but they don't form complete rings. In spite of the little information on the Andean cat and its requirements, it can be affirmed that the habitat of the Andean cat is naturally fragmented and of high fragility, particularly in the high Andean desert regions. The habitat specificity of their prey, the mountain vizcachas to rocky environments is also possibly a factor influencing Andean cat distribution and population density. In the different studies that are being carried out on the Andean cat and their habitat, it has been observed that bofedales, rocky slopes, colonies of mountain vizcachas and other rodents, as well as the presence of water birds are important components for the Andean cat habitat.

The wild cats play an important ecological role in an ecosystem, because they are at the top of the food chain. Since they are carnivorous, they help to the control of prey populations that are part of their food. The small cats usually feed on several classes of mice and small birds or of medium size.

In Chile, the Andean cat has been registered in Arica y Parinacota and Antofagasta Regions. Their greatest threats in the country are opportunistic hunting, habitat loss and the decline of their prey populations.

The Andean cat, along with the pampas cat (*Leopardus colocolo*), were both considered as sacred animals by some Andean cultures, and were related with abundance and welfare; their skins are still being used in ceremonies where people mark their native cattle (llamas and alpacas) or at the beginning of the sowing or harvest period. Both species are known as "titi", "titimisi" or "titiphisi" by Aymara people and as "osqhollo" by Quechua people.



LUGAR DE PRESENCIA COMPROBADA EN CHILE / CERTIFIED PRESENCE OF ANDEAN CAT IN CHILE

## GATO ANDINO EN CHILE / ANDEAN CAT IN CHILE

